

コマツナで使用できる主な農薬 (2015.8.19現在)

中央農業改良普及センター東部分室

【殺虫剤】

| 薬剤名 | 薬剤系統区分 | 有効成分 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用回数 |
|--------------------------|--------------|-------------------|--|------------|------|
| エスマルクDF水和剤 | BT | バチルスチューリンゲンシス産生毒素 | コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、オオタバコガ | 1 | — |
| カスケード乳剤 | IGR(昆虫成長制御剤) | フルフェノクスロン | コナガ、アオムシ、マメハモグリバエ | 7 | 2 |
| マッチ乳剤 | | ルフェヌロン | アオムシ、コナガ | 3 | 3 |
| アグロスリン乳剤 | 合成ピレスロイド | シペルメトリン | アブラムシ類 | 1 | 2 |
| フォース粒剤 | | テフルトリン | ネキリムシ類、キスジノミハムシ | は種時 | 1 |
| アクタラ顆粒水溶剤 | ネオニコチノイド | チアメトキサム | アブラムシ類 | 3 | 2 |
| アクタラ粒剤5 | | | | は種時 | 1 |
| アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 | | ジノテフラン | アブラムシ類、キスジノミハムシ | 3 | 2 |
| アルバリン粒剤 スタークル粒剤 | | | | は種時 | 1 |
| アドマイヤー1粒剤 | | イミダクロプリド | アブラムシ類 アブラムシ類、コナジラミ類 | は種時 | 1 |
| アドマイヤーフロアブル | | | | 14 | 2 |
| モスピラン顆粒水溶剤 | | アセタミプリド | アブラムシ類、キスジノミハムシ、カブラハバチ アブラムシ類、キスジノミハムシ、カブラハバチ コナガ、アブラムシ類 | 7 | 1 |
| モスピラン水溶剤 | | | | 7 | 1 |
| モスピラン粒剤 | | | | は種時 | 1 |
| ダントツ粒剤 | | クロチアニジン | アブラムシ類 アブラムシ類 | は種時 | 1 |
| ダントツ水溶剤 | | | | 3 | 3 |
| アクテリック乳剤 | | 有機リン | ピリミホスメチル | アブラムシ類 | 7 |
| ジェイエース粒剤 | アセフェート | | アブラムシ類 | は種前 | 1 |
| ダイアジノン粒剤5 | ダイアジノン | | ケラ、ネキリムシ類、キスジノミハムシ | は種時 出芽時 | 1 |
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノシン | スピノサド | アオムシ、コナガ、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ | 14 | 2 |
| ディアナSC | | スピネトラム | コナガ | 1 | 2 |
| エコピタ液剤 | 天然物由来 | 還元澱粉糖化物 | アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病 | 1 | — |
| サンクリスタル乳剤 | | 脂肪酸グリセリド | アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病 | 1 | — |
| アフーム乳剤 | マクロライド | エマメクチン安息香酸塩 | コナガ | 3 | 2 |
| アニキ乳剤 | | レピメクチン | コナガ、ハスモンヨトウ、キスジノミハムシ、ハモグリバエ類 | 1 | 3 |
| プレバソンフロアブル5 | ジアミド | クロラントラニプロール | コナガ | 1 | 2 |
| フェニックス顆粒水和剤 | | フルベンジアミド | コナガ | 1 | 2 |
| コテツフロアブル | その他 | クロルフェナピル | コナガ、アオムシ、ハクサイダニ | 3 | 1 |
| アクセルフロアブル | | メタフルミゾン | コナガ、ハスモンヨトウ、キスジノミハムシ | 1 | 3 |
| ウララDF | | フロニカミド | アブラムシ類 | 1 | 2 |
| プレオフロアブル | | ピリダリル | コナガ | 1 | 2 |

使用時期の数字は、収穫前の日数を示す。1とは収穫前日までを意味する。

コマツナで使用できる主な農薬 (2015.8.19現在)

【殺菌剤】

| 薬剤名 | 薬剤系統区分 | 有効成分 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用回数 |
|--|--------------|------------------|-------------------------|--------------------|------|
| Zボルドー水和剤 | 銅 | 塩基性硫酸銅 | べと病、黒腐病、軟腐病、褐斑細菌病、斑点細菌病 | — | — |
| ジーファイン水和剤 | 無機・銅 | 炭酸水素ナトリウム | 白さび病、うどんこ病、軟腐病 | 1 | — |
| リドミル粒剤2 (この商品は生産終了) (代替剤: ユニフォーム粒剤) | 酸アミド | メタラキシル | 白さび病 | は種前 | 1 |
| アミスター20フロアブル | ストロビルリン | アゾキシストロビン | 白さび病 | 7 | 2 |
| ユニフォーム粒剤 | 酸アミド・ストロビルリン | メタラキシル・アゾキシストロビン | 白さび病 | は種時 | 1 |
| フロンサイド粉剤 | その他 | フルアジナム | 根こぶ病 | は種前 (ただし収穫21日前) | 1 |
| オラクル粉剤 | | アミスルプロム | 根こぶ病 | は種前又 は定植前 | 2 |
| オラクル顆粒水和剤 | | | 根こぶ病 | は種前 | 2 |
| ライメイフロアブル | | | 白さび病 | 3 | 3 |
| ネビジン粉剤 | | フルスルファミド | 根こぶ病 | は種前又 は定植前 | 1 |
| ネビリュウ粉粒剤 | | | | は種前 | 1 |
| ランマンフロアブル | | シアゾファミド | 白さび病 | 3 | 3 |

使用時期の数字は、収穫前の日数を示す。1とは収穫前日までを意味する。